

Clearfield® система за производство на маслодайна рапица БАСФ инструкции за употреба на Clearfield® системата в България

**ПРЕДИ ДА СЕ ОТВОРИ ОПАКОВКАТА СЪС СЕМЕНАТА, ДА СЕ ПРОЧЕТАТ ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
И ДА СЕ СПАЗВАТ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА СЕИТБАТА!**

Общи положения

1) Какви изисквания трябва да се спазват при производство на маслодайна Clearfield рапица?
Да се използва хербицида **Clearanda** само при **Clearfield** хибриди маслодайна рапица.

2) Какво трябва да се съблюдава при използване на Clearfield системата?

- Спазвайте винаги утвърдените правила за добри земеделски практики в Европейския съюз и България. Използвайте навсякъде и когато това е възможно интегрирано управление на плевелите, като контролирате тяхното разпространение още преди да засеете рапица по системата **Clearfield**.
- Спазвайте винаги актуалното законодателство и съблюдавайте инструкциите в етикета на съответния хербицид, за да постигнете възможно най-добри резултати и безопасност при извеждане на борбата с плевелите.

Предотвратяване на щети от неправилно използване на технологията

- 1) Обърнете внимание на това, че семената **Clearfield** и хербицидите **Clearfield** носят винаги търговската марка на **Clearfield**. След името на съответния хибрид рапица се намира винаги наставката „**CL**“.
- 2) **Не използвайте други хербициди**, а само предназначения за тази цел – **Clearanda**.

Антирезистън мениджмънт. Контрол върху създаването на резистентност от плевелите

- Във всички случаи спазвайте българските инструкции за предотвратяване и управление на създаването на резистентност при някои плевели.
- Използвайте максимално агротехническите мерки – сеитбообръщения, дълбока оран, равно сеитбено легло, сеитба в подходящите срокове и др.
- Не разчитайте само на хербициди с еднакъв механизъм на действие върху житните и широколистни плевели на едни и същи полета в продължение на много години. Използвайте програми за резервоарни смеси или редуване на хербициди с различен механизъм на действие в рамките на сеитбо-обръщението.
- За контрол върху устойчиви към някои хербициди житни плевели винаги използвайте комбинации под формата на резервоарни смеси или редуване с други ефикасни грамнициди с различен механизъм на действие.
- Обследвайте редовно посевите и разследвайте причините, ако се установят участъци с недостатъчно хербицидно действие.
- Когато международната организация HRAC (Комитет за проучвания върху устойчивостта на хербицидите) докаже или подозира резистентност в плевелните популации, на хербициди от група Б (инхибитори на синтеза на ацетолатат (ALS) и синтеза на

ацетохидрокси киселина (AHAS), в които влизат сулфонилури, имидазолинони, триазолопиримидини, пиримидинил бензоат) да се следват конкретни специфични препоръки от БАСФ преди използването на **Clearfield** системата за производство на рапица.

Контрол на самосевките от Clearfield рапица

1) Добра хигиена на полето: След реколтиране на **Clearfield** рапицата е възможно на това поле, а вероятно и в съседни полета, да се появят самосевки от **Clearfield** рапица като следствие на нормалните селскостопански дейности, а е възможно и чрез опрашване на съседна конвенционална рапица. Поради това спазвайте винаги добра хигиена на полето, особено:

- чрез качеството на извеждане на борбата с плевелите в рапицата;
- предотвратяване механичното разпиляване на семената по полето при придвижването на машините за сеитба или при прибиране на реколтата;
- стимулирайте и провокирайте покълването на самосевките от **Clearfield** рапицата веднага след жътвата, така че да е възможно тяхното унищожаване с подходящи хербициди или чрез механични обработки на почвата преди засяване на следващата култура.

2) Предотвратяване създаването на резистентни плевели: За контрол на самосевките от **Clearfield** рапица използвайте или (а) подходящи хербициди, които не се числят към група Б*, или (б) комбинация от подходящи хербициди, които не се числят към група Б**, заедно с такива от група Б*. Използването на хербицид с активни вещества от различни групи е установена практика за намаляване на опасността от възникване на резистентни на плевелите. Обърнете се към Вашия търговец/дистрибутор на хербицидите за **Clearfield** рапица или към регионалния търговски представител на БАСФ, за да се консултирате за най-добрите възможности за използване на ефикасни хербициди срещу самосевките от **Clearfield** рапица.

Условия за използване

Системата за производство на рапица **Clearfield** се използва само на базата на тези инструкции за употреба. С това се отхвърля възможността за противоречиви информации и препратки към потребителите,

Отговорности

Нито БАСФ СЕ, Германия, нито което и да е дъщерно предприятия носят по някакъв начин отговорност към потребителя за загуба или щети вследствие на използването или във връзка с използването на (а) хербициди от група Б, които не са **Clearfield** хербициди за използване при рапичните **Clearfield** сортове, или (б) поради неспазване на посочените по-горе инструкции. БАСФ отхвърля изрично всякаква отговорност в тази връзка, а потребителят заявява съгласието си от поемането на такава отговорност.

* Хербицидите от група Б, тоест инхибиторите ALS, са продукти, базирани на следните химически групи: инхибитори на синтеза на ацетолатат (ALS) и синтеза на ацетохидрокси киселина (AHAS, в които влизат сулфонилури, имидазолинони, триазолопиримидини, пиримидинил (тио) бензоат)). Допълнителна информация за отделните хербицидни групи ще намерите на <http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx>

* Допълнителна информация, включително и специални препоръки за унищожаване на самосевки на **Clearfield** рапица ще намерите на уебсайта www.clearfield.bg