

Clearfield® Girasole Stewardship

Per garantire i migliori risultati ottenibili nella coltura del girasole attraverso il **Clearfield** Production System, risulta necessario attenersi alle seguenti linee guida:

Linee guida	Perchè?	Come?
Rotazione delle colture	Per permettere l'alternarsi delle modalità d'azione dei diserbanti e delle lavorazioni del terreno. Parallelamente, questa tecnica riduce il rischio del manifestarsi di alcune malattie, la pressione degli insetti e delle Orobanche.	Alternare sempre la coltura del girasole Clearfield con altre colture non Clearfield come cereali e mais. Procedere con la rotazione delle colture almeno ogni tre anni.
Alternare gli erbicidi insieme alla rotazione delle colture	Questo al fine di permettere la riduzione della dipendenza continua dagli erbicidi ALS-inibitori, e fornire una modalità d'azione alternativa per il controllo del girasole Clearfield ed altre malerbe ALS-resistenti che possono essere presenti.	Non superare un massimo di due trattamenti con erbicidi ALS-inibitori (HRAC gruppo B), in ciascun campo, in un periodo di quattro anni. Non fare affidamento solamente sulla chimica ALS durante la rotazione delle colture.
Controllo delle piante spontanee	Piante spontanee ed erbacce agiscono da infestanti su questa coltura e svolgono un'importante funzione di accumulo e diffusione delle principali malattie. L'impollinazione incrociata con piante infestanti aumenta il rischio di tolleranza agli erbicidi.	Le infestanti del girasole Clearfield possono essere controllate con tutti gli erbicidi attualmente registrati per questa coltura, con la possibile eccezione delle sulfoniluree, in cui un basso livello di tolleranza incrociata può compromettere il corretto controllo. Evitare la produzione di sementi di piante spontanee all'interno e all'esterno dei vostri campi.
*Controllo del girasole selvatico	Questo per ridurre al minimo la possibilità di impollinazione incrociata tra il girasole selvatico e quello Clearfield.	Controllo del girasole selvatico nelle aree adiacenti a quelle coltivate con il girasole Clearfield (fossi, bordi dei campi, confini di recinzione) mediante l'uso di erbicidi non-ALS, oppure mediante falciatura dell'infestante prima di procedere con la semina.
Attenersi alle quantità di erbicida indicate in etichetta	La quantità di erbicida raccomandata fornisce il controllo più efficace nelle più svariate condizioni ambientali. Ciò contribuirà a garantire che il seme infestante non contaminerà i semi selezionati ed eviti lo sviluppo di resistenze nelle infestanti.	Attenersi strettamente alle dosi riportate in etichetta, in quanto esse riflettono i risultati delle prove di efficacia che indicano la migliore risposta possibile in termini di resa della coltura e controllo delle erbe infestanti.

**Evitare di utilizzare gli stessi erbicidi ALS-	Per evitare un impatto negativo sulla tolleranza della coltura del Girasole Clearfield.	Non utilizzare nelle colture precedenti prodotti ALS a lunga persistenza.
---	---	---

Gli agricoltori dovrebbero vedere il **Clearfield** Production System come un attrezzo nella cassetta degli attrezzi, ed utilizzarlo in campo al bisogno.

* Da comunicare nei paesi che presentano una popolazione di girasole selvatico.

** Per ulteriori informazioni, contattare il funzionario di vendita BASF locale.