

## Sistemul de producție Clearfield® pentru cultura de rapiță

### Bune practici BASF de utilizare pentru România

Înainte ca produsul să fie aplicat, utilizatorii trebuie să citească și să respecte integral următoarele instrucțiuni.

#### General

##### 1) Sistemul de producție *Clearfield* pentru rapiță

Utilizați erbicidul *Clearfield* pentru rapiță doar la hibridii de rapiță *Clearfield*.

##### 2) Conformitate

- Bunele practici agricole: Urmați întotdeauna bunele practici agricole locale. Atunci când este posibil, utilizați metodele integrate de management al buruienilor, cum ar fi combaterea buruienilor răsărite înainte de semănarea culturii de rapiță *Clearfield*.
- Legislația în vigoare: Respectați întotdeauna legislația în vigoare și urmați instrucțiunile de folosire a erbicidelor înscrise pe etichetă, pentru a obține cel mai bun control posibil al buruienilor.

#### Evitarea afectării culturii

- 1) Evitarea aplicării incorecte. Rețineți că ambalajele semințelor *Clearfield* și erbicidele *Clearfield* au întotdeauna inscripționată marca *Clearfield*. De asemenea, numele hibridilor pentru rapiță *Clearfield* au întotdeauna sufixul "CL".
- 2) Utilizarea erbicidelor din Grupa B\* (menționate mai jos). Pentru a evita afectarea culturilor, nu se va aplica asupra hibridilor pentru rapiță *Clearfield* niciun erbicid care nu face parte din Grupa B<sub>2</sub> și care nu este un erbicid pentru rapiță *Clearfield*.

#### Managementul rezistenței buruienilor

- Respectați întotdeauna regulamentele locale privind prevenirea și managementul rezistenței buruienilor la erbicide. Luați în considerare măsurile culturale (rotația culturilor, aratul etc.)
- Nu folosiți doar erbicide cu un singur mod de acțiune pentru controlul buruienilor monocotiledonate sau dicotiledonate pe același teren pe o perioadă de mai mulți ani. Utilizați un program de amestecuri de erbicide în rezervor sau tratamente separate cu erbicide cu moduri diferite de acțiune în cadrul rotației culturilor.
- Pentru controlul buruienilor graminee rezistente la erbicide, folosiți întotdeauna erbicidul *Clearfield* separat sau în amestec în rezervor cu alte erbicide graminicide omologate, cu moduri diferite de acțiune.
- Monitorizați câmpurile în mod regulat și analizați cauzele combaterii reduse a buruienilor în anumite zone (în cazul în care acestea apar) Acolo unde este dovedită rezistența la erbicidele din Grupa B HRAC sau suspectată într-o populație de buruieni, urmați recomandările specifice BASF înainte de folosirea culturilor în sistemul de producție *Clearfield*.

## **Managementul samulastrei de rapiță *Clearfield***

### **1) Buna igienă a câmpului.**

După cultivarea rapiței *Clearfield*, samulastra de rapiță *Clearfield* poate apărea în câmpul respectiv și, eventual, pe parcele vecine, ca urmare a unor practici agricole normale și, probabil, în urma polenizării între cultura de rapiță și culturi vecine.

Aplicați întotdeauna o bună igienă în câmp și, în special:

- evitați mutarea mecanică a semințelor de la un câmp la altul cu echipamente de semănat sau de recoltat
- stimulați germinația samulastrei de rapiță *Clearfield* după recoltare deoarece samulastra poate fi controlată cu erbicide sau prin lucrări mecanice.

### **2) Evitarea dezvoltării de buruieni rezistente la erbicide**

Pentru a controla samulastra de rapiță *Clearfield*, fie folosiți (a) un erbicid corespunzător ce nu face parte din Grupa B, fie (b) o combinație între erbicide corespunzătoare ce nu fac parte din Grupa B cu erbicide din Grupa B.

Vă rugăm contactați distribuitorul dumneavoastră local sau un reprezentant BASF pentru a stabili care sunt cele mai bune opțiuni privind erbicidele disponibile pentru controlul samulastrei de rapiță *Clearfield*.

## **Condiții de utilizare**

Sistemul de producție *Clearfield* pentru rapiță este furnizat exclusiv cu condiția respectării prevederilor privind bunele practici de utilizare.

Referirile ulterioare ale utilizatorului cu privire la conflictul cu propriile sale condiții generale sunt astfel respinse.

## **Responsabilitate**

Compania BASF SRL sau companiile sale afiliate nu pot fi făcute responsabile în nici un fel față de utilizatori pentru orice pierderi sau daune rezultate din, legate de, sau în legătură cu, (a) utilizarea de erbicide din Grupa B, care nu sunt erbicide *Clearfield*, aplicate hibridilor de rapiță *Clearfield* sau (b) non-conformitatea cu oricare dintre celelalte instrucțiuni menționate mai sus.

În astfel de situații, compania BASF nu își asumă niciun fel de responsabilitate, aceasta fiind preluată de către utilizator.

\*Grupa B erbicide: inhibitori de ALS, sunt produse din următoarele familii chimice: imidazolinone, pirimidine, sulfonamide, sulfoniluree, triazolopirimidine.

Pentru mai multe informații privind grupurile de erbicide, vizitați:

<http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx>

\*Pentru informații suplimentare, inclusiv pentru recomandări specifice privind erbicidele destinate combaterii samulastrei de rapiță *Clearfield* vizitați [www.clearfield.basf.eu](http://www.clearfield.basf.eu).